

INFORMARE:**Gravitatea Flavescenței Aurii - *Grapevine flavescence dorée phytoplasma***

Stimați Fermieri,

Vă aducem la cunoștință că **Flavescența aurie**, o boală extrem de gravă care afectează vița de vie, reprezintă o amenințare serioasă pentru culturile viticole din regiunea noastră. Este esențial să fiți informați și să luați măsurile necesare pentru a proteja viile și pentru a preveni răspândirea acestei boli.

Ce este Flavescența Aurie?

Flavescența aurie este o fitoplasmoză cauzată de fitoplasme, microorganisme patogene similare bacteriilor, dar fără perete celular.

Aceste fitoplasme sunt transmise în principal de **cicada *Scaphoideus titanus***, un vector foarte eficient.

**Simptome**

Semnele infecției cu flavescența aurie includ:

- Îngălbenirea sau înroșirea frunzelor (în funcție de soiul de viță de vie);
- Frunzele au marginile răsucite către partea inferioară și devin casante;
- Lipsa lignificării lăstarilor;
- Struguri care nu ajung la maturitate și/sau se stafidesc.

**Impactul Economic și Ecologic**


Boala poate avea consecințe devastatoare asupra producției de struguri și vin, conducând la:

- Reducerea semnificativă a randamentului culturilor;
- Costuri suplimentare pentru tratamente și măsuri de control;
- Necesitatea eradicării plantelor infectate, ceea ce implică pierderi financiare majore și timp pentru replantare.

Măsuri de Prevenire și Control

Pentru a preveni și controla răspândirea flavescenței aurii, vă recomandăm următoarele acțiuni:

- **Monitorizare Continuă:**
 - Inspectați regulat viile pentru simptomele bolii și pentru prezența cicadelor mai ales prin instalarea capcanelor galbene lipicioase.
- **Tratament Insecticid:**
 - Aplicați tratamente insecticide specifice pentru controlul vectorului *Scaphoideus titanus*.
- **Eradicarea Plantelor Infectate:**
 - Îndepărtați și distrugeți imediat plantele care prezintă simptome de flavescență aurie pentru a preveni răspândirea.
- **Plante Sănătoase:**
 - Utilizați material săditor certificat și sănătos pentru replantare.
- **Consultare:**
 - Colaborați cu Autoritatea Națională Fitosanitară pentru implementarea măsurilor adecvate și pentru informare continuă.



T1 - POLECI
T2 - POLECI
T3 - EXIREL

- Tratamente fitosanitare omologate, recomandate pentru vectorul *Scaphoideus titanus* Ball:
 - **POLECI (DECA 2,5 EC** a doua denumire comercială) – 40 – 60 ml/hl (0,04 – 0,06%), recomandat a fi aplicat în perioada iernii pentru a combate ouăle depuse, sau
 - **SIVANTO ENERGY 85 EC** – 0,4 L/ha, se aplică la dezvoltarea completă a inflorescențelor până la sfârșitul înfloririi BBCH 57-81, sau
 - **JACKPOT 2,5 EC (DELTASAP 2,5 EC** a doua denumire comercială) – 0,3 – 0,6 L/ha, sau
 - **SANIUM SYSTEM** – 4 L/ha, cu timp de pauză de 14 zile, sau
 - **EXIREL** – 0,75 – 1 L/ha, se aplică după înflorit BBCH 71-.

Concluzie

Flavescența aurie este o problemă serioasă care necesită atenție și acțiune promptă.

Informarea și colaborarea dintre fermieri și autorități sunt esențiale pentru a menține sănătatea viilor și pentru a asigura o producție viticolă de calitate.

Vă încurajăm să rămâneți vigilenți și să urmați recomandările pentru a proteja vița de vie și a preveni răspândirea acestei boli devastatoare.

Cu stimă,

Coordonator Oficiul Fitosanitar Alba,

Morariu Paula, ofalba@anf.ro

